





PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE



Area Città e Territorio
Direttore arch. Mario Casati
Gruppo di progettazione
Progettazione e Coordinamento generale
Oggetto: Servizio Pianificazione Urbana arch. Mario Genovesi

Progettisti
arch. Paola Cigliotto
arch. Sabina Anna Lancini
arch. Francesco Sparo
arch. Roberto Bernasconi
arch. Beatrice Nicolovich

Collaboratori
dottoressa Rossella Diavaco
arch. Edoardo Gatti
dot. Michele Grison
arch. Flaminia Pavoni
dot. arch. Anna Tassi
p.l. Andrea Zaccagna

Elaborazioni grafiche
geom. Paolo Cervigni
geom. Andrea Cusi
geo. Mauro Pennone
dot. Luca Sassi
dot. arch. Anna Tassi
p.l. Andrea Zaccagna

- Dati forniti dall'Università di Trieste - prof. L. Poldini
- AC6 - Fiumi di risorgiva ed altri corsi d'acqua con vegetazione sommersa radicante
 - AF2 - Saggi e pozze meso-eurofite a prevalente vegetazione natante non radicante (pleustofita)
 - AF6 - Laghi e laghetti di media profondità con prevalente vegetazione natante radicante (riofita)
 - BL11 - Cinghietti delle doline
 - BL17 - Querceti su suoli collinari e terre rosse
 - BL18 - Ostriro-querceti del Carso
 - BL18-GH7 - Mosaico di arbusteti dominati da *Palurus spinosa-christi* e di ostriro-querceti
 - BL18-GH8 - Mosaico di arbusteti polimerici a *Cotinus coggygria* prevalente e di Ostriro-querceti
 - BL20 - Ostrieti delle rupi e dei ghiaioni calcarei carsici
 - BL21 - Ostrieti postmeridionali esposti a nord
 - BL21-GH8 - Mosaico di arbusteti polimerici a *Cotinus coggygria* prevalente e di Ostrieti postmeridionali esposti a nord
 - BL25 - Boschiglie dominate da *Carpinus orientalis*
 - BM18 - Ostriro-querceti del Carso coniferati
 - BM20 - Ostrieti delle rupi e dei ghiaioni calcarei coniferati
 - BM21 - Ostrieti postmeridionali esposti a nord coniferati
 - BS1 - Ostriro-leccete su substrati calcarei
 - BL5 - Boschi ripariali plantati dominati da *Salix alba* e/o *Populus nigra*
 - BL11 - Arbusteti su suoli inondati dominati da *Salix cinerea*
 - CA7 - Vegetazioni su suoli salmestri ricchi in nitrati a specie annuali
 - CA18 - Vegetazioni su suoli sabbiosi-limosi ricchi in nitrati a *Elytrigia atherica* (**Agropyron pungens*)
 - CP9 - Costa rocciosa esposta a moderato aerosol alino con *Centaurea jactatissima*
 - CP8 - Scogli, ghiaie costiere e dei mandati sottoposti ad intenso aerosol alino con *Cistidium maritimum*
 - D1 - Prati poliflora e coltivazioni ad erba medica
 - D3 - Colture estensive dei vigneti tradizionali
 - D4 - Colture estensive cerealicole e degli orti
 - D5 - Sottiglie a *Rubus ulmifolius*
 - D6 - Boschetti nitrofilo a *Robinia pseudoacacia* e *Sambucus nigra*
 - D7 - Boschetti di *Alliathus altissima*
 - D11 - Formazioni a *Helianthus tuberosus*
 - D15 - Verde pubblico e privato
 - D16 - Vegetazione urbana
 - D22 - Vegetazione delle postcolture e degli scassi
 - GM2 - Masetti termofili su substrati marinoso-arenacei a *Spartium junceum*
 - GM3 - Arbusteti collinari su substrati calcarei a *Juniperus communis* prevalente
 - GM4 - Masetti submediterranei a *Rubus ulmifolius*
 - GM5 - Siepi a *Cornus sanguinea* subsp. *Hungarica* e *Rubus ulmifolius*
 - GM6 - Arbusteti pionieri su litosuoli calcarei a *Prunus mahaleb* e *Frangula rupestris*
 - GM7 - Arbusteti dominati da *Palurus spinosa-christi*
 - GM8 - Arbusteti polimerici a *Cotinus coggygria* prevalente
 - GM9 - Arbusteti polimerici su suoli profondi a *Prunus spinosa*
 - GM10 - Preboschi su suoli evoluti a *Corylus avellana*
 - OB3 - Otri boschivi
 - PC1 - Praterelli aridi pionieri discontinui
 - PC3 - Praterie primarie su substrato calcareo del Carso dominate da *Sesleria juncifolia*
 - PC4 - Praterie (lande) xerofite ad attenuata termofilia
 - PC9 - Prato-pascolo su terre rosse del Carso
 - PC100 - Area d'intervento per recupero landa
 - PM1 - Prati da falcio dominati da *Arrhenatherum elatius*
 - PVC - Pineta con scotano subdominante
 - PVfo - Pineta con ornello subdominante
 - PiSigma - Pineta con rinnovio di latifoglie subdominanti
 - PiSigma - Pineta con latifoglie codominanti
 - PiRC - Pineta con sottiglie di rovo e clematide
 - PiSaSSCh - Pineta di neoformazione con *Sesleria autumnalis* o *Sesleria juncifolia* e/o *Carex humilis*
 - RG4 - Ghiaioni calcarei termofili nord-adriatici a *Drypis jaccipiana*
 - RG5 - Garighe rupestri nord-adriatiche a *Salvia officinalis*
 - RU1 - Rupi carsiche sottoglie a *Campanula pyramidalis* e *Tuscorum flavum*
 - RU2 - Pavimenti calcarei orizzontali collinari e montani
 - RU4 - Rupi calcaree sottoglie montane a *Potentilla caulescens*
 - UC1 - Vegetazioni eliofiche d'acqua dolce dominate da *Phragmites australis*
 - Mosaico agricolo (colture permanenti, seminativi a rotazione, zone agricole eterogenee)