2416238
2416500
2417000
2417500
2418000
2418500
2419000
2419500
2420000
2420500
2421000
2421500
2422000
2422500
2423000
2423500
2424000
2424500
2425000
2425500
2426000
2426500
2427000
2427500
2428000
2428500
2429000
2429500
2430000
2430398
5066822
5066500
5066000
5065500
5065000
5064500
5064000
5063500
5063000
5062500
5062000
5061500
5061000
5060500
5060000
5059500
5058902

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
COMUNE DI TRIESTE
Area Città e Territorio
Servizio Pianificazione Urbana

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE



Area Città e Territorio
Direttore arch. Marina Cassin
Gruppo di progettazione
Progettazione e Coordinamento generale
Dirigente Servizio Pianificazione Urbana arch. Maria Genovese

Progettisti
arch. Paola Cigalotto
arch. Sabina Anna Lenoci
arch. Francesco Spanò
arch. Roberto Bertossi
arch. Beatrice Micovilovich

Collaboratori
dott.ssa Rossella Diviacco
arch. Ezio Golini
dott. Michele Grison
arch. Manuela Parovel
dott. Roberto Prodan

Elaborazioni grafiche
geom. Paolo Cernivani
geom. Andrea Conti
m.o Mauro Pennone
dott. Luca Sussich
dott. arch. Anna Trani
p.i. Andrea Zacchigna

Uso del suolo non edificato

A2
TAVOLA 1

Dicembre 2015
Scala 1:10.000

TriesTe

CTRN edizione 2003 aggiornata alla data 30.04.2012 a cura del Comune su autorizzazione regionale

Dati forniti dall'Università di Trieste - prof. L. Poldini

■ AC6 - Fiumi di risorgiva ed altri corsi d''acqua con vegetazione sommersa radicante
■ AF2 - Stagni e pozze meso-eutrofici a prevalente vegetazione natante non radicante (pleustofitica)
■ AF6 - Laghi e laghetti di media profondita con prevalente vegetazione natante radicante (rizofitica)
■ BL11 - Carpineti delle doline
■ BL17 - Querceti su suoli colluviali e terre rosse
■ BL18 - Ostrio-querceti del Carso
■ BL18-GM7 - Mosaico di arbusteti dominati da Paliurus spina-christi e di ostrio-querceti
■ BL18-GM8 - Mosaico di arbusteti policormici a Cotinus ciggygria prevalente e di Ostrio-querceti
■ BL20 - Ostrieti delle rupi e dei ghiaioni calcarei carsici
■ BL21 - Ostrieti postnemorali esposti a nord
■ BL21-GM8 - Mosaico di arbusteti policormici a Cotinus ciggygria prevalente e di Ostrieti postnemorali esposti a nord
■ BL25 - Boscaglie dominate da Carpinus orientalis
■ BM18 - Ostrio-querceti del Carso coniferati
■ BM20 - Ostrieti delle rupi e dei ghiaioni calcarei coniferati
■ BM21 - Ostrieti postnemorali esposti a nord coniferati
■ BS1 - Ostrio-lecceta su substrati calcarei
■ BU5 - Boschi ripari planiziali dominati da Salix alba e/o Populus nigra
■ BU11 - Arbusteti su suoli inondati dominati da Salix cinerea
■ CA7 - Vegetazioni su suoli salmastri ricchi in nitrati a specie annuali
■ CA10 - Vegetazioni su suoli sabbioso-limosi ricchi in nitrati a Elytrigia atherica (=Agropyron pungens)
■ CP9 - Coste rocciose esposte a moderato aerosol alino con Centaurea kartschiana
■ CP8 - Scogli, ghiaie costiere e dei manufatti sottoposti ad intenso areosol alino con Crithmum maritimum
■ D1 - Prati polifitici e coltivazioni ad erba medica
■ D3 - Colture estensive dei vigneti tradizionali
■ D4 - Colture estensive cerealicole e degli orti
■ D5 - Sodaglie a Rubus ulmifolius
■ D6 - Boschetti nitrofili a Robinia pseudoacacia e Sambucus nigra
■ D7 - Boschetti di Ailanthus altissima
■ D11 - Formazioni a Helianthus tuberosus
■ D15 - Verde pubblico e privato
■ D16 - Vegetazione urbana
■ D22 - Vegetazione delle postcolture e degli scassi
■ GM2 - Mantelli termofili su substrati marnoso-arenacei a Spartium junceum
■ GM3 - Arbusteti collinari su substrati calcarei a Juniperus communis prevalente
■ GM4 - Mantelli submediterranei a Rubus ulmifolius
■ GM5 - Siepi a Cornus sanguinea subsp. Hungarica e Rubus ulmifolius
■ GM6 - Arbusteti pionieri su litosuoli calcarei a Prunus mahaleb e Frangula rupestris
■ GM7 - Arbusteti dominati da Paliurus spina-christi
■ GM8 - Arbusteti policormici a Cotinus coggygria prevalente
■ GM9 - Arbusteti policormici su suoli profondi a Prunus spinosa
■ GM10 - Preboschi su suoli evoluti a Corylus avellana
■ OB3 - Orli boschivi
■ PC1 - Praterelli aridi pionieri discontinui
■ PC3 - Praterie primarie su substrato calcareo del Carso dominate da Sesleria juncifolia
■ PC4 - Praterie (lande) xerofile ad attenuata termofilia
■ PC9 - Prato-pascolo su terre rosse del Carso
■ PC100 - Area d''intervento per recupero landa
■ PM1 - Prati da sfalcio dominati da Arrhenatherum elatius
■ P/C - Pineta con scotano subdominante
■ P/Fo - Pineta con orniello subdominante
■ P/sigma - Pineta con rinnovo di latifoglie subdominanti
■ P|Ssigma - Pineta con latifoglie codominanti
■ P/RC - Pineta con sodaglie di rovo e clematide
■ P/SaSjSCh - Pineta di neoformazione con Sesleria autumnalis o Sesleria juncifolia e/o Carex humilis
■ RG4 - Ghiaioni calcarei termofili nord-adriatici a Drypis jacquiniana
■ RG5 - Garighe rupestri nord-adriatiche a Salvia officinalis
■ RU1 - Rupi carsiche soleggiate a Campanula pyramidalis e Teucrium flavum
■ RU2 - Pavimenti calcarei orizzontali collinari e montani
■ RU4 - Rupi calcaree soleggiate montane a Potentilla caulescens
■ UC1 - Vegetazioni elofitiche d''acqua dolce dominate da Phragmites australis
■ Mosaico agricolo (colture permanenti, seminativi a rotazione, zone agricole eterogenee)